

**advantage**

## Antipulgas para cães e gatos

**Uso veterinário****Fórmula:**

Cada 1mL contém:  
 Imidacloprida ..... 100 mg  
 Veículo q.s.p. .... 1 mL

**Indicações:**

O produto é indicado para a prevenção e tratamento das infestações por pulgas (*Otenocephalides spp.*) dos cães e gatos.

**Modo de usar e Dosagens:**

Verifique o peso de seu animal. Certifique-se na tabela abaixo que ele está na faixa de peso adequada para esta apresentação:

Animal	Intervalo de Peso	Dose de tratamento
cães	até 4 kg	0,4 mL
cães	entre 4 e 10 kg	1,0 mL
cães	entre 10 e 25 kg	2,5 mL
cães	acima de 25 kg	4,0 mL
gatos	até 4 kg	0,4 mL
gatos	acima de 4 kg	0,8 mL

- 1) Retire uma bisnaga plástica do blister.
- 2) Segure-a na posição vertical e retire a tampa.
- 3) Recolha a tampa no sentido inverso ao anterior e gire-a, quebrando o laço.



- 4) Retire a tampa e aplique todo o conteúdo de uma única bisnaga diretamente sobre a pele seca do animal, na região da nuca ou da cernelha. Os pelos devem ser afastados até que a pele esteja visível para facilitar a aplicação.



Para cães acima de 25 kg:

Proceder como descrito passo 1 a 4 e aplicar o conteúdo de uma única bisnaga de 4,0 mL em quatro pontos ao longo da linha do dorso do animal.

**Para gatos acima de 4 Kg:**

Proceder, como descrito nos itens 1 a 4 e aplicar o conteúdo de duas bisnagas de 0,4 mL em dois pontos ao longo da linha do dorso do animal.

**Recomendações:**

O produto elimina 98% - 100% das pulgas adultas presentes sobre os cães e gatos, logo no primeiro dia de tratamento e continua eliminando novas pulgas reinfestantes por pelo menos 4 semanas. Estas novas pulgas, emergentes no ambiente onde vive o animal ou adquiridas em passeios, morrem após um curto período de contato com a pele do animal tratado, antes que possam pôr ovos, quebrando o ciclo do parasita. O tratamento com intervalos mensais é recomendado para obter-se um controle antipulgas e prevenção ideais. Estratégias efetivas para o controle de pulgas, devem levar em conta as pulgas adultas vivendo em seu hospedeiro e o potencial de reinfestação causado pelas novas gerações de pulgas que se desenvolvem no ambiente. O uso intensivo de xampus e sabonetes pode reduzir a duração da proteção antipulgas. Nestes casos, recomenda-se, uma reaplicação do produto. O intervalo mínimo para reaplicações, caso necessário, é de uma semana. O uso profilático deste produto fica a critério do médico veterinário. O produto pode ser

usado seguramente em fêmeas em qualquer fase da gestação ou da lactação, em animais jovens (cães a partir de seis semanas de idade e gatos a partir de dez semanas de idade) e idosos, isoladamente ou em combinação com outros produtos veterinários. **Advantage**® pode ser usado como parte do tratamento estratégico contra a dermatite alérgica a picada de pulgas. O produto tem gosto amargo, e por isso pode causar salvação, caso seja lambido imediatamente após a aplicação, sem maiores problemas.

**Modo de Ação:**

O produto contém Imidacloprida, uma cloronicotínil nitroguanidina sintética. Seu princípio ativo difere dos produtos antipulgas convencionais (tais como piretróides, carbamatos, organofosforados, inibidores da síntese de quitina; inibidores de crescimento e fenilpirazóis). A atividade da Imidacloprida baseia-se na sua forte ligação aos receptores nicotínicos das regiões pós-sinápticas do sistema nervoso central dos insetos, interrompendo a transmissão de impulsos nervosos colinérgicos dos parasitos. Devido às propriedades do produto, este se espalha por toda a superfície da pele do animal, matando as pulgas por contato. O produto não é absorvido e não possui, portanto, ação sistêmica.

**Efeito Larvicida:**

Larvas de pulgas presentes na cama e nas áreas frequentadas pelos animais tratados com **Advantage**® serão eliminadas quando estas forem expostas ao contato com a Imidacloprida. Este efeito, somado à ação adulticida do produto, garante uma rápida desinfestação do ambiente.

**Precauções:**

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Manterna o produto na embalagem original. Não use a embalagem vazia. Não guarde ou aplique junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos. Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto. Mantenha o produto afastado do fogo e do calor excessivo. Use luvas protetoras para aplicar o produto. Evite o contato do produto com a pele, olhos e boca. Descartar a embalagem de forma segura, evitando contaminar o meio ambiente. O solvente de **Advantage**® pode interagir com certos materiais, incluindo plásticos, couro, tecidos e superfícies com acabamento. Por esta razão, recomenda-se deixar o animal sem coleira e roupinha até que o local da aplicação esteja seco; mantendo-o igualmente afastado de móveis e tecidos delicados. Após a aplicação do produto, remover as luvas e lavar bem as mãos. No caso de contato com a pele, lavar o local imediatamente com água e sabão em abundância. Em casos muito raros, pessoas sensíveis podem manifestar reações cutâneas individuais (alergia, irritação, formigamento) após a manipulação do produto. No caso de contato direto com os olhos, lave-os imediata-

mente com água corrente. No caso da persistência dos sintomas cutâneos e oculares, ou no caso da ingestão acidental, procure o serviço médico de emergência, levando consigo a embalagem do produto.

**Tratamento médico de emergência:**

GRUPO QUÍMICO: Nitroguanidinas  
 INGREDIENTE ATIVO: Imidacloprida  
 AÇÃO TÓXICA: Agonista da acetilcolina  
 ANTÍDOTO/TRATAMENTO: Não há antídoto específico.

**Contraindicações:**

Deve-se evitar o contato do produto com os olhos e a boca do animal.

**Reações Adversas:**

O produto é de sabor amargo e ocasionalmente pode ocorrer salvação se cães ou gatos lambem o local da aplicação imediatamente após a aplicação. Este não é um sinal de intoxicação e normalmente desaparece após alguns minutos. Dentro da dose recomendada não são esperadas alterações da pele dos animais; porém, cães ou gatos com histórico de hipersensibilidade podem apresentar reações alérgicas cutâneas. Nos casos de irritação, desconforto ou sensibilidade, banhar o animal demoradamente, com água e sabão neutro em abundância, pelo menos três vezes seguidas, para remoção do produto. Procurar o Médico Veterinário no caso da persistência dos sintomas. Não existe antídoto específico. Aplicar tratamento sintomático.

**Apresentação:**

Cartelas com 1 bisnaga plástica de 0,4 mL, 1 mL, 2,5 mL ou 4,0 mL.

**Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.**

LEVE SEU ANIMAL REGULARMENTE AO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 5780 em 19/12/96.

Proprietário e Fabricante: **Bayer S.A.**

Estrada da Boa Esperança: 650 - Belford Roxo - RJ  
 CNPJ 18.459.628/0033-00

Responsável Técnica: Emily da Rosa Pereira  
 CRF-RJ 14.034

**CUIDADO VENENO****Bayer**