



# Baytril®

## Injetável 5%

Uso Veterinário  
Antimicrobiano



**Baytril® Injetável 5%** é um potente agente quimioterápico de ação bactericida pertencente ao grupo dos derivados do ácido quinoloncarboxílico. Possui um largo espectro de ação antimicrobiana e distingue-se por uma atividade "in vitro" e "in vivo" particularmente elevada, devido a um efeito bactericida que entra rapidamente em ação. Uma vantagem especial do **Baytril® Injetável 5%** consiste na sua alta eficácia contra bactérias e micoplasmas resistentes a outras substâncias antimicrobianas.

### Modo de ação:

Devido ao seu especial mecanismo de ação, os derivados do ácido quinoloncarboxílico recebem o nome de "Inibidores da Girase" bacteriana.

Os "Inibidores da Girase" são substâncias que atuam diretamente sobre a enzima DNA-GIRASE, intervindo assim, ativamente no ponto central do metabolismo bacteriano. Isto provoca uma incapacidade de multiplicação das bactérias.

### Composição:

Cada 100 mL contém:  
Enrofloxacinó..... 5 g  
Veículo q.s.p. .... 100 mL

### Indicações:

**Baytril Injetável 5%** atua contra as infecções dos cães e gatos, causadas por bactérias gram-negativas e gram-positivas, espiroquetas e micoplasmas, sensíveis à Enrofloxacinó.

É especialmente indicado nas:

- Infecções dérmicas (piodermites) causadas por *Staphylococcus intermedius*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas* spp. e *Proteus mirabilis*.
- Infecções respiratórias (pneumonias) causadas por *Pasteurella* spp., *Escherichia coli*, *Streptococcus* spp., *Klebsiella* spp., *Bordetella bronchiseptica*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas* spp. e *Mycoplasma* spp.
- Infecções entéricas (diarreias) primárias ou secundárias causadas por *Escherichia coli*, *Campylobacter* spp e *Salmonella* spp.
- Infecções do ouvido (otites) causadas por *Pseudomonas* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. e *Proteus* spp.
- Infecções geniturinárias causadas por *Escherichia coli*, *Staphylococcus* spp., *Proteus* spp., *Streptococcus* spp., *Pseudomonas*

spp., *Enterobacter* spp., *Brucella* spp., *Mycoplasma* spp. e *Klebsiella* spp.

- É também indicado no tratamento das onfaloflebitas, das infecções pós operatórias decorrentes de castrações, laparotomias e lesões acidentais.

### Modo de usar:

**Baytril® Injetável 5%** já vem pronto para o uso. Com auxílio de uma seringa e agulha, aplicar o produto por via endovenosa ou subcutânea.

### Dosagens:

A dosagem terapêutica para cães e gatos é de 5,0 mg do princípio ativo por kg de peso, ou seja, 1 mL de **Baytril® Injetável 5%** para cada 10 kg de peso corporal, uma vez por dia, durante 5 dias.

### Interações medicamentosas:

Evitar o uso associado de quinolonas com complexos vitamínicos ou soluções que contenham ferro, zinco, manganês e cálcio pois eles reduzem a absorção de enrofloxacinó.

### Observações:

Em testes clínicos de campo não foram relatados casos de claudicação ou problemas nas juntas de quaisquer raças. Entretanto, de acordo com estudos toxicológicos, o enrofloxacinó é contra-indicado em cães de raças pequenas e médias durante a fase de crescimento rápido (entre 2 e 8 meses de idade). Nas raças grandes, este período poderá chegar a até 18 meses.

Não é recomendado o uso em gatos com menos de 8 semanas de idade.

Quando da injeção por via subcutânea, even-

tualmente podem ocorrer reações locais. Por isso recomenda-se o uso de compressas quentes no ponto da aplicação, logo após a administração do produto.

### Cuidados e instruções:

Observar os cuidados normais de assepsia para injeções nos animais.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Não guarde ou aplique junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

LEVE SEU CÃO E SEU GATO REGULARMENTE AO VETERINÁRIO.

### Apresentação:

Frasco-ampola contendo 10mL.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 2747, em 13/11/87.

Fabricado segundo fórmula original da Bayer da Alemanha.

Proprietário e fabricante:

**Bayer S.A.**  
Rua Domingos Jorge, 1100  
São Paulo - SP  
CNPJ 18.459.628/0001-15

### Responsável Técnico:

Léa B. H. Lucas  
CRMV-SP 8290  
**Indústria Brasileira**



# Bayer