

Drontal®



gatos

Uso Veterinário

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido contém:

Praziquantel	20 mg
Pamoato de pirantel	230 mg
Excipiente q.s.p.	339 mg

INDICAÇÕES

O produto é especialmente indicado para o tratamento e controle das verminoses intestinais dos gatos, apresentando excelente atividade contra os seguintes parasitos:

Cestódeos (vermes chatos):

- *Dipylidium caninum*
- *Echinococcus granulosus*
- *Echinococcus multilocularis*
- *Joyeuxiella pasqualei*
- *Mesocostoides* spp.
- *Taenia* spp.

Nematódeos (vermes redondos):

- *Ancylostoma braziliense*
- *Ancylostoma tubaeforme*
- *Toxocara cati*
- *Toxascaris leonina*

MODO DE USAR E DOSAGENS

Verifique o peso de seu gato a fim de calcular a dose correta para o tratamento. Os comprimidos podem ser cortados e combinados para tratar os animais de forma prática, com dosagens mais precisas. O esquema abaixo fornece as doses recomendadas para as diferentes faixas de peso dos gatos: 1 comprimido trata 4 kg de peso, conforme a tabela abaixo:

Peso do animal	Dosagem
gatos até 1,0 kg	1/4 de comprimido
de 1,1 a 2,0 kg	1/2 de comprimido
de 2,1 a 3,0 kg	3/4 de comprimido
de 3,1 a 4,0 kg	1 comprimido
de 5,1 a 6,0 kg	1 e 1/2 de comprimido
de 7,1 a 8,0 kg	2 comprimidos

Drontal® Gatos deve ser administrado por via oral em dose única. Caso necessário, o produto pode ser ministrado à ração, carne ou peixe, sendo muito bem tolerado e dispensando regime especial ou jejum prévio.

RECOMENDAÇÕES

Uma única dose de **Drontal® Gatos** elimina os cestódeos e os nematódeos presentes no intestino do gato. Porém, larvas de nematódeos que estejam migrando pelo organismo do animal chegarão ao intestino em diferentes intervalos de tempo, peculiares a cada espécie de verme, estabelecendo uma nova infestação. Somam-se a elas larvas e ovos adquiridos do ambiente contaminado. Assim sendo, faz-se necessário repetir o tratamento após um determinado tempo, de acordo com o período pré-patente do verme diagnosticado, que deve ser avaliado pelo médico veterinário, com base na espécie de verme, no ambiente e no manejo do gato.

Para prevenir reinfestações por *Dipylidium caninum*, deve-se tratar de forma integrada o gato e o ambiente a fim de controlar as pulgas, hospedeiras intermediárias deste verme chato.

No caso do gênero *Ancylostoma*, as larvas dos vermes penetram ativamente pela pele ou são ingeridas a partir do ambiente contaminado.

Já o *Toxocara cati* infesta os filhotes chegando ao leite através da glândula mamária; ou pela ingestão dos ovos. A gata pode adquirir o verme ingerindo aves ou roedores. As larvas desse verme permanecem inativas na musculatura da gata, produzindo infestações por diversas crias consecutivas.

Por essa razão, recomenda-se o tratamento da fêmea antes da cobertura e 10 dias antes do parto. Os filhotes podem ser tratados durante a lactação e após o desmame, com 2, 4, 8 e 12 semanas, e aos 4, 5 e 6 meses. Deve-se vermifugar a gata ao mesmo tempo que a ninhada. Os adultos podem ser vermifugados a cada três meses.

Junto com a vermifugação deve ser feita uma limpeza rigorosa do ambiente com produtos à base de cloro ativo, efetivos contra larvas e ovos dos vermes.

Os cestódeos e nematódeos dos gatos representam também um sério risco para humanos.

A remoção imediata das fezes do gato limita a contaminação do ambiente por vermes.

Consulte o médico veterinário para adequar o tratamento a cada situação particular.

CONTRAINDICAÇÕES E REAÇÕES ADVERSAS

Os estudos de toxicidade sobre o produto indicam uma ampla margem de segurança, sem contraindicações ou efeitos colaterais, podendo inclusive ser utilizado durante a gestação e lactação, conforme o esquema de tratamento proposto. Após o tratamento, animais altamente infestados por vermes podem apresentar vômitos, diarreias e apatia, causados pela morte e desintegração desses parasitos no intestino do gato. A presença de vermes inteiros ou fragmentos de vermes nas fezes do gato tratado é indicativo de grandes cargas parasitárias.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição do médico veterinário.

LEVE SEU GATO REGULARMENTE AO VETERINÁRIO

APRESENTAÇÃO

Cartuchos com blister contendo quatro comprimidos de 339 mg cada um.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 9.592/2011, em 24/03/2011.

Proprietário da Fórmula:

Bayer Animal Health GmbH - Leverkusen - Alemanha
Fabricante: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH - Kiel - Alemanha

Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor: **Bayer S.A.**, Rua Domingos Jorge, 1100 - São Paulo - SP, CNPJ 18.459.628/0001-15

Responsável técnica:

Léa B. H. Lucas
CRMV-SP 8290

Produto Importado



Bayer